

ORDONNANCE COLLECTIVE	Initier et administrer de l'ACÉTAMINOPHÈNE (per os ou par voie rectale) lors de présence de fièvre ou de douleur légère à modérée		DSI-OC-04
Référence à un protocole <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Date de mise en vigueur : 2009	Date de révision : 2012	
Professionnelles habilitées à exécuter l'ordonnance et secteur(s) d'activité(s) visé(s) : Infirmières habilitées possédant la formation, les connaissances et les compétences nécessaires. Secteur(s) d'activités(s) visé(s) : <input checked="" type="checkbox"/> CLSC: Programme Services courants <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement			
Groupe de personnes visées ou la situation clinique visée : <ul style="list-style-type: none"> Toute clientèle qui présente de la douleur légère à modérée et/ou de la fièvre 			
Activités réservées s'adressant aux infirmières : <ul style="list-style-type: none"> Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique Initier une mesure thérapeutique selon une ordonnance Administrer et ajuster des médicaments lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance 			

Intention thérapeutique :

- Diminuer la fièvre
- Soulager la douleur légère à modérée

Indications et condition d'initiation

- Température de **38.5 °C R (ou 38° C B)** ou plus entraînant un inconfort
- Signe de douleur légère à modérée (**1 à 3 sur échelle de douleur de Gélinas** 1 à 10)

Contre-indications :

- Allergie, intolérance ou hypersensibilité à l'acétaminophène
- Lorsque le client a reçu la dose maximale quotidienne sécuritaire d'acétaminophène incluant l'ordonnance régulière (à moins d'avis contraire d'un médecin).
 - Dose maximale de 4000 mg/24 heures pour l'adulte
 - Dose maximale de 85 mg/kg/24 heures pour l'enfant
- Insuffisance hépatique sévère connue

Limites/ référence au médecin :

- Lorsque la $T^{\circ} > 39.9^{\circ} \text{C}$.
- Si non soulagement de la douleur dans les 24 heures.
- Lors de céphalée ou de fièvre, si non soulagement après 2 doses.

Directives :

➤ Avant d'administrer l'acétaminophène

- Vérifier l'absence d'allergie, d'intolérance ou d'hypersensibilité à l'acétaminophène.
- Vérifier si insuffisance hépatique sévère.
- Prendre la T° , les signes vitaux (TA, pouls, respiration) ainsi que le poids de tous les enfants.
- Lorsque le client présente de la douleur et/ou de la fièvre, évaluer selon le PQRST et rechercher la cause.
- Vérifier la médication régulière du client qui contient de l'acétaminophène (empracet...) afin de ne pas dépasser la dose maximale par 24 heures
- Vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse significative.
- Vérifier l'heure de la dernière prise d'acétaminophène
- Vérifier le tableau pour la posologie selon l'âge et le poids (annexe 1)

➤ Administrer l'acétaminophène per os ou en suppositoire

- Privilégier la voie intra-rectale si vomissements sans diarrhée ou si la situation clinique suggère de garder le client à jeun.
- Réévaluer le client (s'il est encore en notre présence) ou le résident en CHSLD, 30 à 60 minutes après lui avoir administré de l'acétaminophène.

Posologie

Enfants	15 mg/kg aux 6 heures	Per Os (max 65mg/kg/24 hres)
	ou	
Enfants	20 mg/kg aux 6 heures	I.R. (max 85mg/kg/24 hres)
Adultes	650 mg aux 4 heures	Per Os (max 4000 mg/24 hres)
	ou	
Adultes	650 mg aux 4 heures	I.R. (max 4000 mg/24 hres)

Références aux méthodes de soins :

- AQESSS, Méthodes de soins infirmiers, méthodes 5.1.4 et 5.7.1

Source :

- CSSS de la Pointe-de-l'Île, ordonnance collective No DSI-OC-02, mai 2007
- CSSS de Memphrémagog, ordonnance collective No A-1.18 A)

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigé par : Lucie Desrosiers, adjointe à la direction des soins infirmiers	
Avec la collaboration de :	

PERSONNES ET INSTANCES CONSULTÉES

<input checked="" type="checkbox"/> CECII <input checked="" type="checkbox"/> CMDP <input checked="" type="checkbox"/> DSP <input type="checkbox"/> CIIA <input type="checkbox"/> CM	

PROCESSUS D'APPROBATION



Approuvé par :  Directeur des soins infirmiers  Adopté par le CMDP	2009/03/12 Date 2009/03/12 Date
--	--

Tableau des doses pré calculées selon le poids chez l'enfant :

		LES GOUTTES N'utiliser que le compte-gouttes fourni	LES SIROPS N'utiliser que la mesure fournie	
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		<ul style="list-style-type: none"> Soulagement rapide et efficace de la fièvre et de la douleur. Arôme de cerise et arôme de banane sans colorant. Sans alcool, ni sucre, ni AAS 	<ul style="list-style-type: none"> Soulagement rapide et efficace de la fièvre et de la douleur. Sans alcool, ni AAS. Concentration simple, arôme de cerise. Concentration double, arôme de cerise et arôme de banane sans colorant 	
ÂGES		DE 0 À 3 ANS	DE 2 À 6 ANS	DE 4 À 10 ANS
POSOLOGIE		CONCENTRATION SIMPLE 80 MG / 1 ML	CONCENTRATION SIMPLE 80 MG / 5 ML	CONCENTRATION SIMPLE 160 MG / 5 ML
lbs	kg			
6 à 11	2,5-5,4	0.5 mL	2,5mL	-
12 à 14	5,5-6,4	1,0	5,0	-
15 à 17	6,5-7,9	1,25		
18 à 20	8,0-9,0	1,5	7,5	-
21 à 23	9,1-10,9	1,75		
24 à 35	11,0-15,9	2,0	10,0	5,0mL
36 à 47	16,0-21,9	3,0	15,0	7.5
48 à 59	22,0-26,9	-	20,0	10,0
60 à 71	27,0-31,9	-	25,0	12,5
72 à 95	32,0-43,9	-	30,0	15,0

Posologie : Administrer la dose nécessaire d'après le poids de l'enfant (consulter le tableau ci-dessus), par voie orale aux 4 à 6 heures. Ne pas excéder 5 doses par jour.

*Les doses sont établies en fonction du poids et non de l'âge de l'enfant et sont donc plus précises que celles indiquées dans le mode d'emploi de l'étiquette ou de l'emballage des produits.

Adapté de : Mead Johnson Canada, (2008)

